

Instructions postopératoires pour les obturations

- La sensibilité est généralement plus visible dans les 24 à 48 heures suivant la fin de l'anesthésie.
- Une sensibilité, notamment au froid, est courante pendant quelques jours après une obturation dentaire. Habituellement, plus la carie est profonde, plus la dent peut être sensible.
- Le tissu des gencives a pu être irrité pendant l'intervention et peut être douloureux pendant quelques jours ainsi que le site d'injection de l'anesthésique.
- La garniture est entièrement prise et prête à être consommée lorsque vous quittez le bureau. Soyez prudent en mangeant jusqu'à ce que l'anesthésique se dissipe afin de ne pas vous mordre les lèvres, les joues ou la langue.
- Les enfants doivent être observés jusqu'à ce que l'anesthésie se dissipe. En raison de la sensation étrange de l'anesthésique, de nombreux enfants mordillent l'intérieur de leurs lèvres, de leurs joues ou de leur langue, ce qui peut causer de graves dommages.
- La restauration finie peut avoir un contour légèrement différent et avoir une texture différente de celle de la dent d'origine. Votre langue amplifie généralement cette petite différence, mais vous vous y habituerez dans quelques jours.
- Si après une semaine ou deux, vos dents ont l'impression qu'elles ne se touchent pas correctement, veuillez appeler le cabinet. Ce problème peut être résolu par un ajustement rapide du remplissage.
- Les obturations ne durent pas éternellement. Comme un nouveau jeu de pneus, les garnitures peuvent s'user et se briser. Un brossage approprié et l'utilisation de la soie dentaire sont recommandés pour vous aider à conserver vos obturations. Un nettoyage des dents tous les six mois et un examen et des radiographies chaque année contribueront à prolonger la durée de vie de vos obturations.